

Analyse	Ergebnis		Referenz/Beurteilung
Untersuchungen aus Blut:			
Hämatologie			
(LG) Kleines Blutbild ²			
Leukozyten	5.8	/nl	3.6-10.0
Erythrozyten	4.64	/pl	4.30-5.75
Hämoglobin	14.9	g/dl	12.5-17.2
Hämatokrit	0.44	l/l	0.37-0.49
MCV	96	fl	80-101
MCH	32.1	pg	27.0-34.0
MCHC	33.6	g/dl	31.5-36.0
RDW	13.1	%	< 15.0
Thrombozyten	246	/nl	140-360
Klinische Chemie			
(LG) GOT (ASAT) ²	27	U/l	< 50
(LG) GPT (ALAT) ²	23	U/l	< 50
(LG) Gamma-GT ²	22	U/l	< 60
(LG) Cholesterin ²	237	mg/dl	< 200 (Zielwert)
(LG) HDL-Cholesterin ²	51	mg/dl	> 40
(LG) LDL-Cholesterin ²	156	mg/dl	< 116
Zielwert bei niedrigem kardiovaskulärem Risiko. Bei Vorliegen von mäßig bis sehr hohen indiv. Risiken niedrigere Zielwerte erforderlich.			
(LG) Triglyzeride ²	148	mg/dl	< 150
(LG) Non-HDL ²	186.3	mg/dl	< 130.0
Laut ESC/EAS sekundäres Ziel bei moderatem kardiovaskulärem Risiko. Bei höherem bzw. sehr hohem Risiko sind niedrigere Werte anzustreben.			
(LG) Glucose ²	103 +	mg/dl	nüchtern: 65-100
(LG) Kreatinin, enzymatisch ²	1.24 +	mg/dl	0.72-1.18
(LG) GFR (CKD-EPI-Formel) ²	59 -	ml/min	
Aufgrund der vergleichsweise ungenauen Kreatinin-GFR ist im Bereich zwischen 40 und 60 die Cystatin-GFR aussagekräftiger.			
Ergebnis- und Normwertangabe bezogen auf Standard-Körperoberfläche von 1.73 qm			
Klassifikation nach KDIGO:			
		> 90	normale Nierenfunktion
60 - 90	mild eingeschränkt	45 - 60	mild bis moderat eingeschränkt
30 - 45	moderat bis schwer eingeschränkt	15 - 30	schwer eingeschränkt
< 15	Nierenversagen		
(LG) Harnsäure ²	5.6	mg/dl	3.5-7.2
Infektionsdiagnostik			
(GU) HBs-Antigen (ECLIA)	nicht reaktiv		
Aufgrund der durchgeführten Untersuchung serologisch kein Anhalt für aktive Infektion.			
(GU) Hepatitis C - Antikörper (ECLIA)	nicht reaktiv		
Serologisch kein Anhalt für eine HCV-Infektion.			
RSV IgG (ELISA) ^{2,3}	125.0 +	RE/ml	negativ: < 16.0 grenzwertig: 16.0-22.0 positiv: > 22.0
RSV IgA (ELISA) ^{2,3}	0.6	Ratio	negativ: < 0.8 grenzwertig: 0.8-1.1 positiv: > 1.1
Serologisch Hinweis auf Kontakt. Zum Nachweis eines deutlichen Titeranstiegs Kontrolle in 2 Wochen empfohlen. Ergebnisse von 0.8 bis 1.0 Ratio sind als grenzwertig zu betrachten			
sonstige Angaben			
Beratung (auch telef.)			
(LG) Gesundheitsvorsorge ⁵			

² Analytik wurde als Unterauftrag an ein Fremdlabor vergeben

³ Methode nicht akkreditiert

⁵ Die Analytik wurde in Ihrer Laborgemeinschaft Nord GbR erbracht

² Analytik wurde als Unterauftrag an ein Fremdlabor vergeben
³ Methode nicht akkreditiert
⁵ Die Analytik wurde in Ihrer Laborgemeinschaft Nord GbR erbracht